

ЗВІТ
кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією
про основні показники наукової діяльності у III кварталі 2025 року

Таблиця 1

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання(стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення)	Одинці виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Дослідити	1. Авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 136600. Науковий твір "Experimental sub-stantiation of the proposed abrasive tool" / Тарашевська Ю. Є., Хілініч Є. С., Кузнецов В. В., Силенко Б. Ю. – Дата реєстрації 26.05.2025	1		
Дослідити	2. Авторське право – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 137273. Науковий твір «Тестові завдання з ортопедичної стоматології для підготовки до інтегрованого тестового іспиту «Крок 2. Стоматологія» / Кузь В.С., Дворник В.М., Кузь Г.М., Тесленко О.І., Марченко К.В., Павліш І.В., Шеметов О.В., Лунькова Ю.С., Семененко І.П. – Дата реєстрації 23.06.2025	1		
Дослідити	3. Стаття Scopus – Viktor D. Kindiy, Petro A. Hasiuk, Dmytro D. Kindiy, Iurii A. Gasiuk, Serhiy G. Zubchenko, Tetiana I. Dzetsiukh, Anna Z. Mykolenko. Analysis of the	1	Провести детальний аналіз та систематизацію ендогенних та екзогенних факторів, що впливають на розвиток періімплантиту після імплантації	Аналіз літератури показує, що, згідно з різними дослідженнями, поширеність періімплантиту коливається від 10% до 50%

	influence of endogenous and exogenous factors on the development of peri-implantitis following dental implantation // Клінічна та профілактична медицина. – 2025. – № 5 (43). – С. 164-171.		зубів, на основі огляду літератури.	протягом 10 років після імплантації зубів. Розуміння ролі ендогенних факторів у розвитку періімплантиту є ключовим для успішної імплантації зубів і допомагає зменшити ризик цього ускладнення, одночасно збільшуючи довговічність зубних імплантатів. Своєчасне виявлення та усунення екзогенних факторів є важливими кроками у профілактиці періімплантиту. Критичним аспектом ефективної профілактики та лікування є розуміння механізмів утворення біоплівки, що сприяє запобіганню її розвитку та сприяє її ранньому усуненню. Було доведено, що періімплантит характеризується значною бактеріальною різноманітністю та високою концентрацією мікроорганізмів у біологічних зразках.
Дослідити	4. Тези наукової конференції – Дворник В.М., Кузь Г.М., Тесленко О.І., Баля Г.М., Кузь В.С., Шеметов О.В., Павліш І.В., Мартиненко І.М. Практичне використання поверхневої електроміографії жувальних м'язів в клініці ортопедичної стоматології у пацієнтів з парафункціями жувальних м'язів // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної	1	Оцінити зміну функціонального стану жувальних м'язів у пацієнтів із парафункцією жувальних м'язів при використанні релаксаційної капи.	Початковий прояв болю під час пальпації жувальних м'язів за ВАШ становив $7,4 \pm 1,2$ бала. За даними МРТ функціональні зміни СНЦС у вигляді дислокації суглобових дисків із репозицією відмічено у 17 пацієнтів із 53. За даними ЕМГ дослідження асиметрія амплітуди жувальних м'язів виявлялася у всіх пацієнтів і в середньому в групі становила $35 \pm 7\%$.

	конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров'я», 30 червня 2025 року, Полтава. – 30.05.2025. – С. 103-105.			Середня амплітуда жувальних м'язів у спокої становила $0,008 \pm 0,002$ мВ. Немає єдиної тактики лікування, оскільки один і той самий поставлений діагноз передбачає різні підходи до впливу на фактори, що спровокували і продовжують впливати на роботу м'язово-суглобового комплексу. Вибір стратегії, визначення її тривалості, так само як і виготовлення капи, вимагають виключно індивідуального підходу
--	--	--	--	---